

養和婦產科中心



跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院5樓

電話：(852) 2835 7878

傳真：(852) 2892 7581

電郵：ogc@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

乙型鏈球菌 須知



養和

查詢或預約，歡迎聯絡我們

© HKSH Medical Group Limited. All rights reserved.

Members of HKSH Medical Group

OGC.0161H/C-04-11-2020

養和婦產科中心

HKSH Obstetrics & Gynaecology Centre

www.hksh.com

甚麼是乙型鏈球菌？

乙型鏈球菌是一種可導致嬰兒患病及死亡的細菌。鑑於早期防預措施未臻完善，每年全球約有數百至數千名嬰兒死於乙型鏈球菌。

感染乙型鏈球菌的嬰兒會出現甚麼情況？

乙型鏈球菌主要會令嬰兒出現敗血症(血液感染)及腦膜炎(腦膜及腦脊液受細菌感染)。大部份屬於早發性病症，於出生後首週出現。

為甚麼要在懷孕期間接受乙型鏈球菌測試？

乙型鏈球菌會於陰道分娩期間經孕婦產道感染胎兒。根據本地研究，約10%孕婦是乙型鏈球菌帶菌者，因此，孕婦應在懷孕約35至37週時從下陰道及直腸取樣本作細菌檢查，報告一般會於數日後交予您的醫生。

倘若孕婦在分娩前未有作乙型鏈球菌篩查，在分娩時亦可從下陰道及直腸取樣本作乙型鏈球菌快速測試，結果一般可於數小時內得悉，以便知道是否帶菌者。

如何預防嬰兒感染乙型鏈球菌？

孕婦如選擇自然分娩並在測試中呈陽性反應，只需於分娩期間接受靜脈注射抗生素，就能預防大部份早發性乙型鏈球菌病症。孕婦如過去曾誕下感染乙型鏈球菌的嬰兒，或受乙型鏈球菌感染而導致膀胱(尿道)炎，亦應於分娩時注射抗生素，以預防嬰兒感染早發性乙型鏈球菌病症。

一般人如何感染乙型鏈球菌？

任何人都可以是乙型鏈球菌的帶菌者，細菌常見於腸道，亦會移至陰道。乙型鏈球菌並非性傳染疾病。大部份患者都不會出現任何症狀，除非在懷孕期間接受測試，一般孕婦都不會得悉自己為乙型鏈球菌帶菌者。

既然我已得悉自己是乙型鏈球菌的帶菌者，為甚麼現在不能使用抗生素？

對帶有乙型鏈球菌的女性而言，分娩前使用抗生素，並非一個有效對付乙型鏈球菌的方法。由於細菌一般會蟄伏於腸道，即使病人有使用抗生素，細菌依然能來去自如。反之，分娩時使用抗生素，能夠大幅減少感染嬰兒的細菌數目。即使您在上一胎分娩時是帶菌者，只要您現胎不是帶菌者，分娩時就無須使用抗生素。由此可見，婦女每次懷孕期間均必須接受測試。

倘若我呈陽性反應，在懷孕或分娩時該作甚麼？

您可與醫生商量，制訂一個包括接受乙型鏈球菌抗生素的分娩計劃。如出現羊水穿破或作產跡象，必須立即啟程往醫院，接受抗生素注射。到埗後應提醒醫院員工，孕婦是乙型鏈球菌帶菌者。研究顯示，若分娩前四小時或之前已開始接受抗生素治療，預防嬰兒感染的效用最大。

如有查詢，請與您的醫生聯絡。