

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話：(852) 2835 8880；(852) 2835 8890

傳真：(852) 2892 7510

eye@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

金鐘

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話：(852) 2855 6700

傳真：(852) 2523 7660

eye@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

眼瞼整形術



查詢或預約，歡迎聯絡我們



眼部的整形和重建手術是眼科的一個分支，包括施行眼部及眼眶周邊的整形及重建手術。整形和重建手術或涉及摘除眼眶腫瘤、重建眼瞼組織缺損(因摘除腫瘤或外傷所致)、矯正與甲狀腺分泌失調有關的眼睛毛病(如眼球突出、眼瞼過高)。重建手術亦適用於治療鼻淚管阻塞或修補眼眶周邊骨折。

上眼瞼手術

眼瞼整形術在亞洲普遍應用於縫合雙眼瞼，接受手術者多為單眼瞼或眼皮因過長而下垂的人士。對年輕人士而言，雙眼瞼能使眼睛驟看較大，而雙眼瞼成形術可以是純粹將眼皮縫高便成，復原時間較短，但效果未必持久。另一種方法是於上眼皮內側切開皮膚然後縫合，形成雙眼瞼，效果較為持久。長者眼瞼皮膚鬆弛，使上眼皮過長而下垂，不單影響外觀，亦令視野受阻。施行手術切除多餘皮膚後，不但令樣子變得年輕，視野亦因眼睛少了多餘皮膚遮蓋而擴闊。

下眼瞼手術

「眼袋」是脂肪從皮下突出所致，常給人一種年老及疲倦的感覺。其中一種治療眼袋的方法是在結膜作一切口，將脂肪抽出並移除。經結膜施行手術，好處是不會在皮膚留下疤痕。



眼袋手術前



手術後一星期，並無瘀血

眼瞼下垂

眼瞼下垂的成因眾多，最常見的是提瞼肌因年長或退化而鬆弛。其他成因包括長期配戴隱形眼鏡、經常用力擽眼，而較罕見者或與神經疾病有關，包括重症肌無力、動眼神經麻痺或霍納綜合症。神經疾病引致的眼瞼下垂，或會嚴重影響病人，甚至致命，故此必須找出眼瞼下垂的原因，予以適切治療。以手術治療提瞼肌鬆弛引致的眼瞼下垂，效果良好，一般可經皮膚或結膜切口施行，後者更不會在皮膚留下疤痕。醫生會按個別狀況，助你決定最合適的治療方案。