

## 內鏡中心

本中心由經驗豐富的內鏡專科醫生主理，以最先進的內視鏡攝影儀器，為消化道、膽胰及呼吸系統疾病的患者提供優質的診斷及治療服務。本中心可安排麻醉科醫生為病者施行監測麻醉，將病者在檢查期間可能出現之不適減至最低。

病者如欲同日接受專科診症及胃鏡檢查，須於檢查前6至8小時禁食（包括飲料及食物）。檢查後，專科醫生會即時告訴你檢查結果。如曾取出組織切片作化驗，檢查報告將於2至3個工作天完成，隨後專科醫生或主診醫生將約見病者解釋報告及治療。

# 內鏡中心 Endoscopy Centre

查詢或預約，歡迎聯絡我們

### 內鏡中心

香港跑馬地山村道二號  
養和醫院李樹培院十五樓  
電話：2835 8623  
傳真：2892 7529  
電郵：endo@hksh-hospital.com


### 辦公時間（敬請預約）

星期一至星期六：上午八時至下午四時  
星期日及公眾假期休息

[www.hksh-hospital.com](http://www.hksh-hospital.com)

© 香港養和醫院有限公司 版權所有

## 胃鏡檢查



養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

內鏡中心  
Endoscopy Centre

## 胃鏡檢查

胃鏡檢查是醫生把一支可屈曲、末端裝有光源及微型攝影機的軟管（約尾指般大小），由病人口腔進入，以觀察食道、胃部及十二指腸是否有潰瘍、腫瘤或發炎等上消化道之疾病，有助於診斷出血、吞嚥困難或腹痛之原因。

## 誰人應接受胃鏡檢查？

如有以下情況，便應接受胃鏡檢查：

- 吞嚥困難
- 復發性的上腹部疼痛
- 胃食道逆流性疾病（胃酸倒流）
- 消化性潰瘍
- 上消化道出血（排出黑色柏油糞便）
- 懷疑患上消化道癌症
- 高危人士作定期癌症普查

## 胃癌普查：我是否需要接受胃鏡檢查？

胃癌是香港常見的癌症，是癌症中的第四大殺手，每年新症接近一千宗。胃癌發病率隨年齡增長而升高，患者平均年齡約為65歲，但近年年輕患者的人數明顯增加。

胃癌的初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，所以我們建議定期進行胃部檢查。如家族有近親曾患上胃癌，則建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。

## 應如何準備？

- 須於檢查前6至8小時禁食（包括飲料及食物）。
- 須於檢查前除下假牙。
- 如到診前已禁食6至8小時，則可於接受醫生評估後即日進行胃鏡檢查。

## 檢查是怎樣進行的？

- 檢查前，醫生或會為你作靜脈注射鎮靜劑，令你在檢查進行期間入睡。
- 醫生會在你的喉部噴上局部麻醉藥，以減輕胃鏡進入時引致的不適（嘔吐反射）。
- 當管子進入喉部時，如你能以吞嚥的動作配合，則有助管子順利由食道進入你的胃部。醫生會輕微推進管子，讓其進入你的食道。
- 於檢查進行時，如醫生發現你的胃部及食道有可疑的地方，會取一小片組織作進一步化驗。
- 這項檢查只需10至15分鐘便可完成。
- 檢查期間出現噁心感覺是正常反應，儘量放鬆有助減輕不適，使檢查較容易進行。

## 檢查後注意事項

- 未有注射鎮靜劑的病人需要休息15至30分鐘，如無任何併發症及得到醫生許可，便可離開。
- 檢查後約一小時，可先試行喝水，以試驗吞嚥能力是否恢復；如無嘔吐感覺及恢復吞嚥能力，則可正常進食。
- 如檢查時曾注射鎮靜藥物，可能會有暈眩的感覺，須由成年親友陪同下方可離開。檢查後24小時內，請勿駕駛、踏單車、操作機械或飲用任何含有酒精之飲料。

- 檢查後，你可能會有輕微的喉痛及/或腹脹，不適的感覺會逐漸減退。如不適的感覺持續，請通知主診醫生。

## 可能引起的風險及併發症

- 抽取活組織、切除息肉及進行內視鏡止血程序引致出血（<0.1%）
- 感染細菌（可能性非常低）
- 食道、胃、十二指腸及小腸穿孔（0.03%）
- 死亡（0.001%）
- 由麻醉藥或鎮定劑引起的藥物敏感或不良反應相當罕見，但同樣有機會發生

假如有併發症，病人或需要進行手術、住院及/或輸血。

