

「養兒一百歲，長憂九十九」，懷孕期間已未雨綢繆計劃日後升學問題，出生後又怕他吃得少長不胖，更怕是傷風感冒，特別是發燒、抽筋最嚇人。四歲的賢仔，精靈活潑坐不定，平日總是嚷着要到公園、到麥當勞，但這兩日發高燒，變得沒精打采，見過醫生服了退燒藥後，仍未見好轉。這天，就連最愛的下午點心亦無興趣……



▲小朋友如發燒，貼上退熱貼可幫助身體降溫，令他們舒服一點，同時要持續監察體溫。



媽媽，我發高燒！

兒童病徵

- 1) 發燒
- 2) 抽筋
- 3) 嘴吐
- 4) 异常哭鬧
- 5) 眼神呆滯
- 6) 劇烈頭痛
- 7) 頸部僵硬
- 8) 專注力不足
- 9) 神志不清

兒童發燒可大可小，如情況與過往非常不同，久燒不退，或神志迷糊，父母宜盡快求醫。



發育未全 易搭錯線

「醫生，賢仔為甚麼會突然發燒又抽筋？」吳太焦急地問。
「其實兒童發燒抽筋是常見，約二十名七歲以下兒童，就有位會出現一次發燒引起的抽筋。」吳太繼續解釋，原因可能是兒童身體各系統正在成長，而負責抗外來刺激的腦部屏障未成熟，很容易在受到衝擊後，出現搭錯線情況，例如受病毒侵襲導致發燒抽搐。

幸好這些發燒引致短暫的抽搐，約五至十分鐘後，大多會逐漸停止，同時亦不會造成生命威

假時……他們沒有提及有同學生病，學校應該沒有集體感染事發生。」吳太回答。

「今朝打電話向幼稚園老師請教，賢仔為甚麼會突然發燒又抽筋？」吳太焦急地問。

「其實兒童發燒抽筋是常見，約二十名七歲以下兒童，就有位會出現一次發燒引起的抽筋。」吳太繼續解釋，原因可能是兒童身體各系統正在成長，而負責抗外來刺激的腦部屏障未成熟，很容易在受到衝擊後，出現搭錯線情況，例如受病毒侵襲導致發燒抽搐。

過燒到抽筋……」吳太答。
楊醫生細心檢查賢仔頭頸後，再向吳太查問：「除了發燒外，賢仔還有其他病徵嗎？學校有沒有同學仔患上手足口病或其他感染疾病？」

「無，他出世時一切正常，有病都是普通傷風感冒，即使發燒溫竟然去到一〇四度！」吳太見到被急召回來的養和醫院兒科專科醫生楊執庸，急於報告兒子情況：「後來他更全身抽筋，他從小都未試過這情況，我好驚……」
「吳太，賢仔有沒有其他先天性疾病或腦部受到感染才會壞腦。」楊醫生強調，發燒不會燒壞腦，只有

時賢仔突然全身震顫抽筋，兩拳緊握，滿臉扭曲通紅，嚇得面青口唇白的吳太立即抱起他往醫院……

吳太即時貼上退熱貼，但此熱下竟發現燒至一〇四度！

奇怪，往日生病時，賢仔只要看見由雞蛋、番茄、腸仔及手指餅乾砌成的豐富茶點，他如何沒精打采都會興奮地大叫，今日如此反應實在不妥，她伸手一探細小的額頭，發熱滾燙得很，探媽說。

